

УХОД ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ РЕБЕНКОМ

Глава I.

ТУАЛЕТ ПУПОВИННОГО ОСТАТКА

Материальное обеспечение:

- 1) лекарственные средства (табл. 1);

Табл. 1. Лекарственные средства, необходимые для выполнения манипуляций

| Вторичная обработка новорожденного | Туалет новорожденного | Туалет пуповинного остатка и пупочной ранки |
|--|---|--|
| вазелиновое (растительное) масло 2 % спиртовой раствор йода (салициловый спирт) 2 % таниновая мазь | физиологический раствор (дистиллированная вода, водный раствор фурацилина 1: 5000) 1% спиртовой раствор йода (салициловый спирт) вазелиновое (растительное) масло 2 % таниновая мазь | 3 % раствор пероксида водорода 70 % этиловый спирт 5 % раствор калия перманганата пленкообразующий антисептик (например, "Лифузоль", "Статизоль") |

- 2) стерильный материал (ватные шарики, марлевые салфетки, деревянные палочки с ватными тампонами) в биксах или крафт-пакетах;
- 3) лоток для стерильного материала;
- 4) лоток для использованного материала;
- 5) пинцет (индивидуальный для каждого ребенка) в крафт-пакете или в дезинфицирующем растворе;
- 6) шпатель (индивидуальный для каждого ребенка) в крафт-пакете или однократного применения;
- 7) стерильные пленки;
- 8) перчатки (стерильные или обеззараженные);
- 9) водонепроницаемый обеззараженный фартук;
- 10) мыло жидкое или индивидуальной фасовки для детей и персонала;
- 11) инструментальный столик;
- 12) детская кроватка с матрацем;
- 13) пеленальный стол с матрацем;
- 14) емкости с антисептическими и дезинфицирующими растворами для обеззараживания рук, поверхностей, использованного медицинского инструментария и оснащения;
- 15) клеенчатый мешок и бак для использованного белья;
- 16) кукла-фантом с медальоном и браслетками.




Рис. 1. Столик инструментальный с оснащением

Подготовительный этап выполнения манипуляции

1. Открыть бак для использованного белья.
2. Вымыть руки с мылом проточной водой, просушить.
3. Надеть фартук, перчатки.
4. Обработать дезинфицирующим раствором инструментальный столик, пеленальный матрац, фартук, бикс. Если в боксе имеется дополнительный "нестерильный" пеленальный

- стол для освобождения ребенка от грязных пеленок, обработать и его отдельной ветошью. Вымыть, просушить руки.
5. Накрывать и промаркировать лоток, выложить в него стерильный материал из бикса (ватные шарики и марлевые салфетки, деревянные палочки с ватными тампонами). Возможен и другой вариант работы со стерильным материалом, когда он находится в крафт-пакетах.
 6. Поставить на инструментальный столик необходимое оснащение (рис. 1).
 7. Проверить дату стерилизации пеленок, вскрыть стерильный мешок для пеленания, расстелить на пеленальном столе пеленки.
 8. Распеленать ребенка в кроватке (или на “нестерильном” пеленальном столе). Внутреннюю пеленку развернуть, не касаясь кожи ребенка руками.
 9. Вымыть, просушить и обработать руки (перчатки) антисептическим раствором.
 10. Подмыть ребенка (при необходимости) и уложить на пеленальный стол.

Основной этап выполнения манипуляции.

11. Вымыть, просушить и обработать руки (перчатки) антисептическим раствором.

12. Захватить рукой лигатуру, подняв за нее пуповинный остаток вверх (рис. 10).

13. При сочном остатке обработать срез палочкой с ватным тампоном, смоченным 70 % спиртом как наиболее вероятные входные ворота инфекции, затем круговыми движениями весь остаток сверху вниз по направлению к основанию. Когда пуповинный остаток мумифицируется, сначала обработать его основание — участок предстоящего отторжения, а затем снизу вверх весь остаток.

14. После обработки остатка этой же палочкой обработать кожу вокруг него от центра к периферии. Другой палочкой с ватным тампоном, смоченным 5 % раствором калия перманганата, обработать пуповинный остаток в той же последовательности, не касаясь кожи живота.



Рис. 10. Туалет пуповинного остатка

Заключительный этап выполнения манипуляций

15. Запеленать ребенка.
16. Обработать поверхность матраца кроватки дезинфицирующим раствором.
17. Вымыть и просушить руки.
18. Уложить ребенка в кроватку.
19. Вылить все растворы, кроме спиртовых. Освободившиеся флаконы передать в аптеку.
20. После окончания туалета и пеленания всех детей в палате (боксе) перчатки и фартук обеззаразить в соответствующих емкостях с дезинфицирующим раствором.
21. Перенести мешок с грязными пеленками в комнату сбора и хранения использованного белья, обеззаразить его. Обеззаразить бак для использованного белья и вложить в него чистый прорезиненный мешок. Эта работа выполняется младшим медицинским персоналом.

Источник: Солодухо Н.Н., Ежова Н.В., Е. М. Русакова Е.М. и др./ Сестринское дело в педиатрии: Учеб. пособие — Мн.: Выш. шк., 1998. - 160 с.