



КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ

*Что
посоветуете,
доктор?*



Знаете ли Вы, что согласно статистическим данным, около 15 - 20% населения Земного шара хотя бы однажды в жизни испытывало острую аллергическую реакцию в виде крапивницы?

Крапивница представляет собой распространенную аллергическую реакцию, которая развивается вследствие всасывания большого количества аллергена в кровяное русло. Заболевание проявляется сильным кожным зудом, местным отеком кожи и образованием волдырей различных размеров.

Известно множество факторов, способных вызвать крапивницу. Это, к примеру, препараты, содержащие салициловую кислоту (аспирин), продукты питания и пищевые красители, контакт с шерстью или слюной домашних животных, изменение атмосферного давления, тепло, холод и прямое воздействие солнечных лучей.

Крапивница характеризуется:

- **сильным зудом**
- **местным отеком**
- **появлением волдырей**

КестинTM
эбастин

**Лучший друг пациентов
с аллергией**





Наиболее часто встречаются случаи острой крапивницы, симптомы которой длятся несколько дней или недель и причину возникновения которой установить достаточно легко. Проявления острой крапивницы наиболее характерны для людей молодого возраста, как мужчин, так и женщин, имеющих наследственную предрасположенность к аллергии.

Около 10% случаев острой крапивницы трансформируются в хроническую, т.е. длящуюся более 6 недель. В 9 случаях из 10 ее причина остается неизвестной.

Хроническая крапивница наиболее распространена у лиц среднего возраста, и, как правило, не связана с другими аллергическими заболеваниями.

К установленным факторам, способным вызвать крапивницу относятся:

- **лекарственные препараты**
- **продукты питания и пищевые красители**
- **контакт с шерстью и слюной домашних животных**
- **изменение атмосферного давления, тепло, холод, воздействие солнечных лучей**



Современными и безопасными средствами для лечения кожных проявлений аллергии являются антигистаминные препараты, не обладающие седативным действием, т.е. не вызывающие заторможенности и сонливости.

К этим высокоэффективным и безопасным лекарственным средствам, надежно предотвращающим симптомы крапивницы, относится новый оригинальный препарат **КЕСТИН**, производимый компанией Рон-Пуленк Рорер (Франция).

КЕСТИН применяется однократно в сутки (таблетка 10 мг) независимо от приема пищи, что совсем необременительно для пациента.

Без риска возникновения побочных реакций **КЕСТИН** можно принимать одновременно с:

- алкоголем
- диазепамом
- теофиллином
- циметидином и другими лекарствами.

КестинTM
эбастин



**В меню для пациентов
с аллергией**



КЕСТИН — единственный антигистаминный препарат с уникальной возможностью гибкого дозирования. Возможность гибкого дозирования означает, что пациент может начать лечение **КЕСТИНОМ** с дозы 20 мг, т.е. 2 таблетки однократно в сутки в случае более выраженных проявлений аллергии. Доказано, что применение двойной дозы этого препарата не приводит к возникновению побочных реакций.


КЕСТИН обладает высокой эффективностью и не оказывает седативного действия. Принимая этот препарат, Вы можете управлять автомобилем, работать с приборами, требующими напряженного внимания, сохранять высокую деловую активность.

***КЕСТИН** — препарат, который надежно защитит Вас от кожных проявлений аллергии любого происхождения.*

КестинTM
эбастин

**Букет преимуществ
для пациентов с аллергией**





Кестин™

эбастин

**Новый антигистаминный препарат
с уникальной возможностью гибкого
дозирования при полном отсутствии
седативного эффекта**

- Гибкая дозировка - 10 или 20 мг в зависимости от выраженности симптомов
- Высокая эффективность при отсутствии седативного действия
- Однократный прием в сутки
- Отсутствие взаимодействий с другими лекарственными препаратами

 **RHÔNE-POULENC RORER**

Представительство компании Рон-Пуленк Рорер:

Москва, 101000, Уланский пер., д 5

Тел (095) 926-57-11/12/13/14/15/16; Факс (095) 926 -57 10; 926-57-25